

## 9. Leislers flagermus

### Beskrivelse

Mellemstor flagermus. Pelsfarven er mørkt brun, bugen gulbrun. Runde ører, lille rundt (paddehatformet) ørelåg.

Vægt 13-20 g alt efter årstid.

Kraftige orienteringsskrig, der med detektor kan høres på lang afstand. De to typer skrig minder om brunflagermusens skrig, men frekvenserne er lidt højere. Plip-plop lyd, ca. 5 per sekund. Sikker artsadskillelse kræver optagelse og analyse på PC.

Sonogram: To typer af skrig. Den ene type har næsten konstant frekvens ved 21-26 kHz. Den anden type starter ved ca. 42 kHz, slutter ved 27 kHz og krummer mod slutningen. Startfrekvensen afhænger af, om landskabet er åbent eller med mange forhindringer.

### Forvekslingsmuligheder

Minder om brunflagermus, der er lidt større. Brunflagermusens skrig har en lidt lavere frekvens og en langsommere rytme (3 per sekund), men det to arter er vanskelige at adskille. Kræver optagelser og analyse på PC.

### Biologi

Flyver ofte højt og frit, også når den jager

Leislers flagermus kommer ligesom brunflagermusen tidligt frem efter solnedgang.

### Levested

Ynglekoloni og vinteropholdssted i træer.

### Udbredelse

Sjælden art. Registreret enkelte steder i Nordsjælland, på Bornholm, på Møn, på Falster, i Nordjylland og ved Slagelse. Måske er der tale om enkeltindivider på træk, måske findes oversete bestande rundt om i landet.

En del af de nordiske Leislers flagermus trækker mod syd om efteråret, men trækforholdene for de danske flagermus er ikke afklaret.