

7. Dværgflagermus (*Pipistrellus pygmaeus*)

Beskrivelse

En af vores mindste flagermusarter. Pelsen er ensfarvet mørkebrun, kun lidt lysere på undersiden. Ret korte afrundede ører med korte afrundede ørelåg.

Kropslængde ca. 4 cm, vingefang ca. 21 cm, vægt 3-8 g alt efter årstid.

Høres bedst med detektor omkring 55 kHz. Ca. 12 skrig per sekund. De sociale lyde høres ofte selv med en almindelig detektor, der dog kun gengiver en kort skratten i højtaleren. Men har man lært sig hvordan det lyder, kan man let genkende disse skrig. De sociale lyde kan høres i hele aktivitetsperioden.

Sonogram: Afbildningen af de enkelte skrig viser en krumning mod slutningen. For de enkelte skrig er startfrekvensen ca. 80 kHz, den størst energi findes ved 55 kHz og den kraftige sidste del af skriget slutter ved ca. 54 kHz. Veldefineret afslutning på skriget. I åbent terræn kan skrigene reduceres til skrig med næsten konstant frekvens. Sociale lyde høres ofte. Mest almindelige er en lille trille bestående af 3 skrig ved ca. 20 kHz hurtigt efter hinanden.

Forvekslingsmuligheder

Pipistrelflagermusens skrig ligger ca. 10 kHz lavere. De to arter kan derfor adskilles ved PC analyse af optagne skrig. De to arter kan ikke skelnes på udseendet, selv om man har dem i hånden. Troldflagermusen er lidt større end pipistrel- og dværgflagermus.

Biologi

Ofte i haver, parker og nær skove. Føden består hovedsageligt af myg. Store ynglekolonier.

Er ofte fremme fra vinterhi allerede i marts måned.

Levested

Ofte kolonier i huse, men også i træer, vinterhi samme steder.

Udbredelse

Udbredt og talrig over det meste af Danmark, dog kun få observationer i Vestjylland. Findes næppe på Bornholm