

15. Skægflagermus

Beskrivelse

En lille art flagermus med mørk, brunlig pels, undersiden mere grå. Ørelåg spidse.

Kropslængde ca. 4,5 cm, vingefang ca. 22 cm, og vægt 4-8 g.

Høres bedst med almindelig detektor ved ca. 45 kHz.

Sonogram: De enkelte skrig har et næsten retlinjet forløb, starter ved ca. 90 kHz og ender ved ca. 32 kHz. Der er stor variation og de enkelte skrig har ikke en veldefineret start og slut. I praksis er det umuligt at skelne Brandts flagermus og skægflagermus.

Forvekslingsmuligheder

Kan ikke skelnes fra Brandts flagermus ud fra lyden. Kan dog skelnes på tandsættet. I mange indberetninger slås de to arter sammen.

Biologi

Ynglekolonier i huse eller i skove. Jager typisk langs skovbryn.

Levested

Fra andre lande vides, at denne art opholder sig i bygninger om sommeren. Overvintrer i kældre og lignende steder.

Udbredelse

De fleste observationer af skægflagermus er fra Bornholm, desuden enkelte spredte fund fra Sønderjylland og øerne.

Fun facts.

En ny art kaldet nymfeblagermus (*Myotis alcathoe*) er i 2001 skilt ud fra arten skægflagermus. Dens skrig begynder ved ca. 120 kHz og ender ved 43-46 kHz. Den høje slutfrekvens synes at være et kendetegn for denne art. Der er desuden små anatomiske forskelle. Er ikke officielt registreret i Danmark, men er observeret i flere europæiske lande, deriblandt Sverige. Så måske får vi også en ny art i Danmark.