

Art: Brun langøre

Forfatter

Carsten Juel 25-04-2021.

Beskrivelse

Mellemstor art. Kaldes også langøret flagermus. Rødbrun med lysere underside. Ekstremt lange ører (ca. 3,5 cm), der kan ses under flugten. Ørelåget (tragus) er langt og spidst. Når brun langøre sidder, kan ørerne være mere eller mindre skjult.

Kropslængde ca. 4,5 cm, vingefang ca. 25 cm og vægt 6-10 g afhængig af køn og årstid.

Svage skrig, høres næppe på mere end 5 m afstand. Høres bedst med almindelig detektor omkring 40-50 kHz. Ca. 10 skrig per sekund. Da der ofte er kraftige overtoner, er det svært at angive den bedste lyttefrekvens.

Sonogram (spektrogram): Startfrekvens ca. 50 kHz, størst energi ved ca. 33 kHz, slut ved ca. 25 kHz. Skrigene har en svag krumning mod afslutningen. Overtonerne kan være lige så kraftige som grundtonerne. I tæt terræn er skrigene kortere og rytmen hurtigere.

Forvekslingsmuligheder

De lange ører gør den let at erkende. Men skrigene er svage og overhøres ofte. Til gengæld er skrigene lette at kende ved analyse på PC.

Biologi

Sen udflyvning i forhold til solnedgang. Jager tæt på vegetationen. Kan stå stille i luften og er derfor i stand til at tage siddende insekter fx natsommerfugle. Ofte bruges en fast ædeplads, der kan afsløres på en bunke efterladte sommerfuglevinger. Man formoder, at den kan høre natsommerfugle uden at bruge ekkolokaliseringslyde.

Levested

Er kendt for at holde til i store bygninger. Kan også findes andre steder, fx i hulheder i træer og fuglekasser. Brun langøre kan jage indendørs i fx en stor lade, men jagten kan også foregå i tæt skov.

Udbredelse

Observeret spredt over hele landet, men færrest fund i Nord- og Vestjylland.